

Pilztherapieschema nach Behrens-Baumann 2009, www.med.uni-magdeburg.de/augenklinik

Stufe	Klinik	Medikament, Konz.	Handelsname	Dosierung	Bemerkung
Ia	<i>Keratomykose</i> Erreger unbekannt	Voriconazol-Tr. 2 % Prednisolon-Tr. 1 %	Vfend®	½- bis 1-stdl. 2- bis 3x tgl.	Apothekenherstellung
Ib	<i>Fusarium sp.</i>	Natamycin-Tr. 5 % Prednisolon-Tr. 1 %	Natacyn®	½- bis 1-stdl. 2- bis 3x tgl.	Internationale Apotheke
Ic	Misserfolg	Amphotericin-B-Tr. 0,5 % Prednisolon-Tr. 1 %	Amphotericin B®	1-stdl. 2x tgl.	Apothekenherstellung Abrasio corneae 2-täglich
II	<i>Hypopyon</i> Erreger unbekannt	wie Ia, Ib bzw. Ic plus Amphotericin B 7,5 µg oder Voriconazol	Amphotericin B® Vfend®	täglich bis alle 2 Tage täglich bis alle 2 Tage	Apothekenherstellung intrakameral Apothekenherstellung intrakameral
III	<i>Endophthalmitis</i> exogen, endogen Erreger unbekannt	Voriconazol Amphotericin B 7,5 µg oder Voriconazol 100 µg/0,1ml	Vfend® Vfend®	2x 4 mg/kg KG oder 600 mg oral je nach Befund mehrfach wiederholen je nach Befund mehrfach wiederholen	209,00 €täglich Apothekenherstellung intravitreal Apothekenherstellung intravitreal
